

Femmina 45 anni.

Motivo della visita: dolori articolari. algie caviglie, polsi e spalla con dolore sordo e profondo alle piccole articolazioni.

RISCONTRI ANAMNESTICI

Nel novembre 08, facendo ECO addome per un colica renale, sono risultati negativi i dati renali ma sono stati rilevati angiomi multipli e steatosi diffusa di grado elevato, gozzo multicistico.

Esami ormonali tiroidei nella norma.

Nel dicembre 08 da segnalare ANA 1:80, trigliceridi 177, altri esami nella norma.

Fatta visita reumatologica e non consigliata terapia.

La scoliosi, che ha segnato la sua vita, è stata curata con gessi e corsetti e ginnastica fatta per 10 anni.

FIBROMI UTERINI DOPO I PARTI.

Allergie ambrosia, parietaria, nocciuolo e ulivo con crisi asmatiche che richiedono impiego massivo di cortisone e antistaminici.

Alvo tendenzialmente stitico da sempre e adesso alvo alterno.

Dorme male per dolori al cingolo scapolare comparsi nell'ultimo mese.

Si arrabbia facilmente e urla. Dopo si sente sfinita ma meglio.

Esame obiettivo: dermalgia a livello colecistico e dell'area epatica, dolore cingolo scapolare dx. Dolore dermalgico fegato+++ e duodeno+.

APPROCCIO TERAPEUTICO in MEDICINA FUNZIONALE

Secondo la Medicina Funzionale in questa paziente sono in gioco due unità funzionali:

Fegato, per la situazione di steatosi, per la modalità espressiva delle crisi asmatiche e Milza-Pancreas per i dolori articolari in cui è sicuramente coinvolta l'autoimmunità".

Nel febbraio 09 decido, quindi, di impostare la terapia sostenendo l'unità funzionale Fegato e prescrivo:

Monoselect BOSWELLIA	2 compresse al di sia per le crisi asmatiche che per i dolori articolari
Monoselect SILYBUM	1 compressa al di
FM*CHELIDONIUM	5 gocce 3 volte al di
FM*AESCLUS	5 gocce 3 volte al di
FMS*CROTALUS	5 gocce 3 volte al di
POLLENSI	5 granuli al mattino

Nel luglio 09 fatta ecografia EBP e netto miglioramento della steatosi.

Allergia molto meglio, non ha più assunto cortisone.

Aumento di peso 4 kg. Caldo e parestesie alle gambe.

Visto il risultato positivo, ma anche l'aumento ponderale e la succulenza con fovea dura agli arti inferiori, imposto la seguente terapia:

Monoselect SILYBUM	1 compresse al di
CARVELIN	2 compresse al di
WIBOTIN	20 gocce 3 volte al di
FMS*MAGNESIUM	5 gocce 3 volte al di
POLLENSI	5 granuli al mattino

Dr.ssa Giuliana Rapacioli